Compatibilité de

PRESTOP®

avec les traitements des cultures (1/2)

Fongicides			
Matière active	Intervalles recommandés (jours)	Matière active	Intervalles recommandés (jours)
Amétoctradine + Dimétomorphe	0	Hymexazole	7
Azoxystrobine	2	Imazalil	2
Azoxystrobine + Difenoconazole	7	Kresoxim-méthyl	0
Benthiavalicarbe isopropyl + Folpel	1	Mancozèbe	4
Bicarbonate de Potassium	0	Mépanipyrim	0
Boscalide + Kresoxim-méthyl	0	Metalaxyl-M	2
Boscalide + Pyraclostrobine	2	Myclobutanil	0
Bupirimate	0	Myclobutanil + Cyclohexanone	0
Carboxine	4	Oxychlorure de cuivre	0
Cyazofamide	1	Penconazole	1
Cyflufénamide	0	Phosphonates de potassium	0
Cymoxanil	0	Prochloraze	7
Cymoxanil + Zoxamide	1	Propamocarbe HCl	0
Difenoconazole	7	Pyriméthanil	1
Dithianon	1	Pyriofénone	3
Fenhexamide	0	Soufre	1
Fludioxonil	4	Spiroxamine + Difenoconazole	7
Fludioxonil + Cyprodinil	4	Sulphate de magnésium + Huile d'Orange	0
Fluopicolide + Propamocarbe HCl	1	Tétraconazole	3
Fluopyram	0 (1)*	Thiabendazole	4
Fluxapyroxad	0	Tiophanate-méthyl	2
Folpel + Diméthomorphe	7	Toclofos-méthyl	2
Fosétyl d'Aluminium	0	Triflumizole	0
Fosétyl + Propamocarbe HCl	0		

* Lorsque PRESTOP® et un produit contenant du fluopyram sont appliqués sur la même partie de la plante, un intervalle d'un jour est recommandé entre les deux applications. Lorsque les racines sont traitées avec un produit qui contient du fluopyram, PRESTOP® peut être pulvérisé sur les feuilles le même jour.

- **L'intervalle recommandé entre l'application de PRESTOP® et les produits phytosanitaires non mentionnés dans la liste est de 7 jours.**
- **PRESTOP® peut être mélangé avec des produits compatibles. Néanmoins, le mélange doit être appliqué immédiatement après la préparation.**
- **Ne pas mélanger PRESTOP® avec des solutions concentrées de pesticides ou fertilisants dans la cuve.**

Note : certaines matières actives peuvent avoir été retirés du marché. Veuillez vous référer à la réglementation.

FRA-FRV10 02/2023

Compatibilité de

PRESTOP®

avec les traitements des cultures (2/2)

Insecticides

Matière active	Intervalles recommandés (jours)
Buprofézine	0
Cyperméthrine	2
Chlorpyrifos-méthyl	0
Deltaméthrine	0
Huile de colza	0
Indoxacarbe	0
Pyréthrine	0
Pirimicarbe	0
Spinosad	0
Tébufenozide	0

Régulateurs de croissance

Nom du produit	Intervalle recommandé (jours)
Pirouette	0

Biostimulants

Nom du produit	Intervalle recommandé (jours)
IntraCell	0

Adjuvants

Nom des produits	Intervalles recommandés (jours)
Addit	0**
Break Thru S240	0
Heliosol	0
Liberate	1
Helioterpen Film	0
Sticman	0

Herbicides

Matière active	Intervalles recommandés (jours)
2,4 MCPB	4
Aclonifène	0
Bentazone	0
Bentazone + Imazamox	0
Ethofumesate	1
Pendiméthaline	0
Propyzamide	0
Prosulfocarbe	2
Pyridate	2

Micro-organismes auxiliaires

Ingrédients actifs	Intervalles recommandés (jours)
Bacillus amyloliquefaciens	Effet négatif sur le développement de *Clonostachys rosea* à température élevée
Bacillus thuringiensis	0
Beauveria bassiana	0
Coniothyrium minitans	0
Lecanicillium muscarium	PRESTOP® peut avoir des effets négatifs sur le développement de *Lecanicillium muscarium* à la surface des feuilles
Metarhizium anisopliae	0
Autres produits à base de micro-organismes appliqués dans le support de culture	Pour éviter toute compétition, privilégier des applications en rotation en respectant, par exemple, un intervalle de 7 jours

Insectes et nématodes auxiliaires

PRESTOP® est compatible avec les insectes et nématodes auxiliaires

Désinfectants

Nom des produits	Intervalles recommandés (jours)
Resiclean (≤0,01%)	0
Huwa-San TR 50 (≤0,04%)	0
Autres	1

** Addit est compatible avec PRESTOP® à une concentration maximale de 0,25%. Des concentrations d'Addit supérieures à 0,25% peuvent être nuisibles à PRESTOP®.

- **L'intervalle recommandé entre l'application de PRESTOP® et les produits phytosanitaires non mentionnés dans la liste est de 7 jours.**
- **PRESTOP® peut être mélangé avec des produits compatibles. Néanmoins, le mélange doit être appliqué immédiatement après la préparation.**
- **Ne pas mélanger PRESTOP® avec des solutions concentrées de pesticides ou fertilisants dans la cuve.**

Note : certaines matières actives ou produits commerciaux peuvent avoir été retirés du marché. Veuillez vous référer à la réglementation.

Détenteur de l'AMM : DANSTAR FERMENT A.G.

Poststrasse 30,
CH-6300 Zug
SUISSE

PRESTOP : AMM N°2120177. Composition : 1.10⁸ UFC/g de *Clonostachys rosea* J1446. Formulation : WP (poudre mouillable). Classification du produit : sans classement – Contient *Clonostachys rosea* (anciennement *Gliocladium catenulatum*). Peut provoquer des réactions de sensibilisation – EUH401 : respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement – SP1 : ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. [Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. / Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes]. Produit de biocontrôle. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit ou consulter www.phytodata.com. Détenteur de l'AMM : DANSTAR FERMENT AG, Poststrasse 30, Zug CH-6300 Suisse.

FRA-FRV10 02/2023

Microbial by nature

LALLEMAND